



SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE
 com: Leordeni, sat Carciumărești, nr.106
 Jud.: Argeș
 e-mail: contact@spitalleordeni.ro
 www.spitalleordeni.ro
 Tel.:0248.653.694, fax:0248.653.690



Informații privind consumul de antibiotice înregistrat la nivelul Spitalului PNF Leordeni în anul 2024

În Spitalul PNF Leordeni, activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) face parte din obligațiile profesionale ale personalului. **Scopul** supravegherii consumului de antibiotice este prevenirea și limitarea incidenței IAAM cu germeni multidrog rezistenți **Prezentarea publică pe site-ul <http://www.spitalleordeni.ro/>** a acestor informații se face conform Ord. M.S. 1101/2016.

Clasa	Cod ATC	Medicament	WHO DDD	U	Calea de administrare	Concentrație	Consum			DDD specific (per medicamentele utilizate)			Consum DDD la 100 zile spitalizare			
							Semestrul I	Semestrul II	Total 2024	Semestrul I	Semestrul II	Total 2024	Semestrul I	Semestrul II	Total 2024	
Penicilina sensibilă la betalactamaza	J01CE01	Benzilpenicilina	3.6	g	P	0.09	325	0	325	8.13	0.00	8.13	0.08	0.00	0.04	
	J01CR02	Amoxicilina și inhibitor de beta-lactamaze	1.5	g	O	0.88	1071	489	1560	624.75	285.25	910.00	6.09	2.78	4.44	
	J01CR02	Amoxicilina și inhibitor de beta-lactamaze	3	g	P	1	1626	786	2412	542.00	262.00	804.00	5.29	2.55	3.92	
	J01CR01	Ampicilina și inhibitor de beta-lactamaze	6	g	P	1	1358	1156	2514	226.33	192.67	419.00	2.21	1.88	2.04	
Carbapeneme	J01DH02	Meropenem	3	g	P	0.5	102	394	496	17.00	65.67	82.67	0.17	0.64	0.40	
	J01DH51	Imipenem și cilastatin	2	g	P	0.5	0	47	47	0.00	11.75	11.75	0.00	0.11	0.06	
Cefalosporine	generația a II-a	J01DC02	Cefuroxim	0.5	g	O	0.5	14	30.52	44.5	14.00	30.52	44.52	0.14	0.30	0.22
		J01DD02	Ceftazidim	0.5	g	O	0.75	0	50	50	0.00	75.00	75.00	0.00	0.73	0.37
	generația a III-a	J01DD04	Ceftriaxona	4	g	P	1	277	235	512	69.25	58.75	128.00	0.68	0.57	0.62
		J01DD62	Cefoperazon și inhibitor de beta-lactamaze	2	g	P	1	5508	3444	8952	2754.00	1722.00	4476.00	26.86	16.79	21.82
Macrolide	J01FA09	Claritromicina	4	g	P	1	31	20	51	7.75	5.00	12.75	0.08	0.05	0.06	
			0.5	g	O	0.5	350	358	708	350.00	358.00	708.00	3.41	3.49	3.45	
Fluoroquinolone	J01MA12	Levofloxacin	0.5	g	O	0.5	1699	1224	2923	1699.00	1224.00	2923.00	16.57	11.93	14.25	
			0.5	g	P	0.5	119	30	149	119.00	30.00	149.00	1.16	0.29	0.73	
	J01MA14	Moxifloxacin	0.40	g	O	0.4	390	278	668	390.00	278.00	668.00	3.80	2.71	3.26	
			0.40	g	P	0.4	25	13	38	25.00	13.00	38.00	0.24	0.13	0.19	
Sulfonamide	J01EC01	Sulfametoxazol	2	g	O	0.4	58	178	236	11.60	35.60	47.20	0.11	0.35	0.23	
	J01EA01	Trimetoprim	0.4	g	O	0.08	58	178	236	11.60	35.60	47.20	0.11	0.35	0.23	
Alte antibiotice	A07AA11	Rifaximin	0.6	g	O	0.2	696	764	1460	232.00	254.67	486.67	2.26	2.48	2.37	
	J01BX01	Colistin	9	MU	P	1	24	0	24	2.67	0.00	2.67	0.03	0.00	0.01	

Concluzii:

- Atât în semestrul I, cât și în semestrul II, cel mai consumat antibiotic a fost **Ceftriaxona** (clasa Cefalosporinelor de generația a III-a), urmat de **Levofloxacin** (clasa Fluoroquinolonelor).

Elaborat de Medic epidemiolog,